

MMG E SELEZIONE DEI PAZIENTI : RAPPORTO CON LE ASST PER LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI

Le determine AIFA hanno reso possibile prescrivere ed erogare l'anticorpo monoclonale nei pazienti COVID positivi. L'erogazione è subordinata alla selezione del paziente eleggibile posta come possibilità anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici delle USCA oltre che ai medici che entrano in contatto con pazienti affetti da COVID di recente insorgenza.

Il paziente eleggibile ha sintomi lievi-moderati e deve rientrare nei criteri di cui all'allegato 1 della determina; una volta selezionato deve essere indirizzato rapidamente alla struttura presso la quale viene prescritto ed effettuato il trattamento.

Per la selezione dei pazienti sono da evidenziare i seguenti aspetti

- 1) Le determine individuano una casistica e di conseguenza DGW ha definito una ceck list che il medico di medicina generale deve produrre in modo tale da fornire al prescrittore le più ampie informazioni possibili per la decisione prescrittiva
- 2) Essendo la disponibilità delle predette terapie infusionali non infinita l'indicazione di massima è quella di selezionare i pazienti che presentano un quadro clinico più complesso essendo maggiore in questa fattispecie l'effetto dell'ospedalizzazione. Per questo motivo qualora ritenuto opportuno possono essere prodotti ulteriori indici come il charlson o frialty index o il vulnerability index che mettono insieme non solo il quadro clinico ma anche la complessità del paziente o la sua fragilità; evidenziando lo score ottenuto

Per l'invio dei pazienti per la prescrizione, ATS invierà ai medici di medicina generale i riferimenti di ogni singola ASST sia per quanto riguarda i professionisti sia per i recapiti di questi ultimi, essendo preferibile qualora organizzativamente possibile una presentazione del paziente.

In allegato si invia la scheda di segnalazione del paziente arruolabile alla terapia con anticorpi monoclonali da compilare a cura del MMG/PLS